


がん化学療法治療計画書 肺がん(1)2020.6

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積	m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

非小細胞肺癌 カルボプラチン、パクリタキセル併用療法(weekly)



投与開始日 年 月 日 クール予定

- PTX 80mg/m² Day 1、8、15 計算量: mg 投与量: mg
(PTX:一般名パクリタキセル、商品名パクリタキセル)
- CBDCA カルバートの計算式 Day 1、8、15 計算量: mg 投与量: mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

【投与スケジュール】

Day1、8、15	<main点滴>			
	1) EL-3号 500mL	1V	6時間	
	<側管点滴>			
	1) 生食 100mL	1V		
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A	30分	初回導入時のみデキサー トは12A
	ファモチジン静注20mg	1A		
	ポラミン 5mg	1A		
				パクリタキセル投与開始1時間前
2) グラニセトン点滴静注液3mgバッグ	1袋	30分		
3) 5%Tz 250mL	1V	90分		
	パクリタキセル () mg		滴下速度調節必要	
4) 生食 100mL	1V	30分		
プリンパン	1A			
5) 生食 500mL	1V	2時間		
			カルボプラチン () mg	
Day2~3、 9~10、 16~17	1) クリニザルツB 200mL	1袋	1時間	
	プリンパン	1A		

- ◆可塑剤としてDEHPを含むポリ塩化ビニル製点滴セットの使用は避けること。
- ◆パクリタキセルは薬剤過敏症に対して厳重な注意が必要です。
投与開始後から1時間(特に10分以内)は患者の状態を十分に観察すること。
- ◆Day 4以降で嘔気・嘔吐、食欲不振があれば
Rp) ナゼアOD 1錠(朝食後)×5日間を追加しても良い。
- ◆AUCは2で計算