## がん化学療法治療計画書 肺がん-(2)2022.1

					/					
				目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和					
					□ 術前補助 □ 術後補助					
				告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知					
				告知内容	□ 癌(原発・再発・進行)					
				급제어습	□ 抗癌剤を使用する					
				服薬指導 ユニック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
身長:	cm	体重:	Kg	<b>加米担等</b>	看護師( ) 薬剤師( )					
本表面積 m <sup>2</sup>			$m^2$	HBV感染スク	クリーニング ロ 確認済み					

非小細胞肺癌 カルボプラチン+パクリタキセル併用療法												
カルボプラチンとパクリタキセルは、Day1に投与。1コース3週間。												
投与開始	计 年	月	<u>日</u>			コース予定	  -					
● PTX 2	00mg/m <sup>2</sup> (PTX:一般名パクリタ <del>:</del>	Day キセル、商品名パ		<u>計算量:</u> ル)	mg	投与量:	mg					
● CBDCA カルバートの計算式(AUC6) Day 1 計算量: mg 投与量: (CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)												
	1) パロノセトロン	点滴静注バッ· .75mg/50mL		1V								
	デキサート注	射液1.65mg		12A		15分						
	ファモチジン静注20mg			1A		••						
	ポララミン 5	mg		1A								
	2) 生食 100	mL		1V		30分						
Day1	プリンペラン 10mg			1A								
	3) 生食 50	0mL		1V	3時間 滴下速度調節必要							
	パクリタキセル	, (	)	mg								
	4) 生食 25	0mL		1V	1時間							
	カルボプラチン	<i>'</i> (	)	mg								
	5)生食 50mL			1V		ルートフラッシュ						
【Day2~3の内服薬】												
Day2~3	デカドロン(4mg	)		2錠	分2 朝•昼£	朝•昼食後 2日間						
<ul><li>専用の点滴セットを使用すること。</li><li>(パクリタキセル: DEHPフリー、0.22ミクロン以下のフィルター付き点滴セット)</li></ul>												
★ パクリタキセル:アルコール過敏症でないことを確認する。												
特記事項												

神戸労災病院 がん化学療法委員会