

がん化学療法治療計画書 肺がん-(4)2014.3

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

カンプト単独療法

非小細胞肺癌 小細胞肺癌

1クール 3・[4] 週間

CPT-11は、Day1、8、[15]に投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

● CPT-11 100mg/m² Day 1、8、[15] 計算量: mg 投与量: mg
 (CPT-11:一般名イリノテカン、商品名カンプト)

【投与スケジュール】

Day1、8、[15]	<main点滴>		
	1) EL-3号 500mL	1V	4時間
	<側管点滴>		
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	1V 3A	30分
	2) 生食 500mL	1V	90分
	カンプト () mg		
	3) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋	30分

- ◆ Day8、15は白血球数3000/mm³未満または血小板数 10万/mm³未満または感染を伴う発熱がある場合または、グレード1以上の下痢がある場合は中止。
- ◆ 下痢に注意！