

担当医/指導医		/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療		<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助		<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知		
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)		
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する		
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する		
	看護師( ) 薬剤師( )		
身長: cm 体重: Kg			
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

**非小細胞肺癌 シスプラチン+ゲムシタピン療法** short hydration

投与開始日 年 月 日 1コース3週間 コース予定

- GEM 1000mg/m<sup>2</sup> Day 1, 8 計算量: mg 投与量: mg  
(GEM: 一般名ゲムシタピン、商品名ゲムシタピン)
- CDDP 80mg/m<sup>2</sup> Day 1 計算量: mg 投与量: mg  
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)

**【Day1の投与スケジュール】**

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	
	アロカリス点滴静注235mg	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	ゲムシタピン ( )mg		
	3) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
4) マンニトールS 300mL	1V	1時間	
5) 生食 350mL		2時間	
シスプラチン ( )mg			
6) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間	
7) 生食 500mL	1V	1時間	

**【Day2, 3の投与スケジュール】**

Day2, 3	1) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	デキサート注射液1.65mg	4A	
2) 生食 500mL	1V	1時間	

**【Day8の投与スケジュール】**

Day8	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg/100mL	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	4A	
	2) 生食 100mL	1V	30分
ゲムシタピン ( )mg			
3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

★ゲムシタピン200mgバイアルは5mL以上、1000mgバイアルは25mL以上の生食に溶解。

★Day4: デカドロンの投与を検討する。

※飲水励行

⇒Day1: 1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

⇒Day2, 3: 外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロンを処方・内服する。