


がん化学療法治療計画書 肺がん-(8)2014.3

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( )	薬剤師( )
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

非小細胞肺癌 カルボプラチン、ゲムシタビン併用療法



1クール 3週間  
CBDCAは、Day1に投与  
GEMは、Day1、8に投与

投与開始日      年      月      日      クール予定

- GEM 1000mg/m<sup>2</sup> Day 1、8      計算量:      mg      投与量:      mg  
(GEM:一般名ゲムシタビン、商品名ゲムシタビン)
- CBDCA カルバートの計算式 Day 1      計算量:      mg      投与量:      mg  
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

【投与スケジュール】

Day1	<main点滴>			
	1) EL-3号	500mL	1V	5時間30分
	<側管点滴>			
	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋		30分
	2) 生食	500mL	1V	2時間
	カルボプラチン (      mg			
	3) 5%Tz	250mL	1V	1時間
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	3A		
4) 生食	100mL	1V	30分	必ず30分間でDIV
	ゲムシタビン (      )mg			
終了後は必ずメインの点滴でルートフラッシュすること！				
Day8	<main点滴>			
	1) EL-3号	500mL	1V	3時間
	<側管点滴>			
	1) 5%Tz	250mL	1V	1時間
		デキサート注射液1.65mg/0.5mL	3A	
2) 生食	100mL	1V	30分	必ず30分間でDIV
	ゲムシタビン (      ) mg			
3) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋		30分	

- ◆ゲムシタビンは投与に1時間かけると毒性の増強あり
- ◆カルボプラチンはAUC=5で計算する。(初回投与で問題があれば変更)