


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

非小細胞肺癌 シスプラチン+ナベルピン療法 short hydration



1コース 3週間 (RT併用時4週間)
CDDPは、Day1に投与
VNRは、Day1、8に投与

投与開始日	年	月	日	コース予定
● VNR 25mg/m ² (RT併用時20mg/m ²) Day1、8				
(VNR:一般名ビノレルピン、商品名ナベルピン)				
● CDDP 80mg/m ² Day 1				
(CDDP:一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)				

【投与スケジュール】

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	
	アロカリス点滴静注235mg	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	2) 生食 50mL	1V	
	ナベルピン ()mg		10分以内で投与
	3) YDソリタT3号 500mL	1V	
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	1時間
Day2, 3	4) マンニトールS 300mL	1V	1時間
	5) 生食 350mL		2時間
	6) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
Day8	7) 生食 500mL	1V	1時間
	1) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	デキサート注射液1.65mg	4A	
Day8	2) 生食 500mL	1V	1時間
	1) 生食 50mL	1V	ナベルピン投与前:血管内留置確認
	2) 生食 50mL	1V	10分以内で投与
	3) ソリタT4 200mL	1V	ナベルピン投与後全開で点滴

- ★ ナベルピン投与前に、正確に血管が確保されていることを確認すること。
- ★ 血管炎予防のため、ナベルピン投与後、輸液を投与する。
- ★ Day4: デカドロンの投与を検討する。

※ 飲水励行

⇒ Day1: 1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

⇒ Day2、3: 外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロンを処方・内服する。