


がん化学療法治療計画書 肺がん-(11)2014.3

| | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| 担当医/指導医 | / | |
| 目的 | <input type="checkbox"/> 積極的治療 | <input type="checkbox"/> 症状緩和 |
| | <input type="checkbox"/> 術前補助 | <input type="checkbox"/> 術後補助 |
| 告知程度 | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 | |
| 告知内容 | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) | |
| | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する | |
| 服薬指導 | <input type="checkbox"/> 依頼する | |
| | 看護師() 薬剤師() | |
| HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み | |

| | | | |
|------|----------------|-----|----|
| 身長: | cm | 体重: | Kg |
| 体表面積 | m ² | | |

非小細胞肺癌 カルボプラチン、ナベルピン併用療法



1クール 3週間(放射線併用時4週間)
 CBDCAは、Day1に投与
 VNRは、Day1、8、[15](放射線併用時)に投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

●VNR 25(放射線併用時20)mg/m² Day1、8、[15] 計算量: mg 投与量: mg
 (VNR:一般名ピノレルピン、商品名ナベルピン)

●CBDCA カルバートの計算式 Day 1 計算量: mg 投与量: mg
 (CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

【投与スケジュール】

| | | | | |
|--|-----------------------|-------|----|---------------------------|
| Day1 | <main点滴> | | | |
| | 1) EL-3号 | 500mL | 1V | 5時間30分 |
| | <側管点滴> | | | |
| | 1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ | 1袋 | | 30分 |
| | 2) ナベルピン () mg | | | 約5分で静注 Dr. 施行 |
| | 合計30mLになるように生食で溶解 | | | |
| Day1 | 3) ソリタT4 | 200mL | 1V | ナベルピン投与後全開で点滴 |
| | 4) 生食 | 500mL | 1V | 2時間 |
| | カルボプラチン () mg | | | |
| | 5) 生食 | 100mL | 1V | 30分 |
| | デキサート注射液1.65mg/0.5mL | 3A | | |
| Day2~3 | 1) ソリタT4 | 200mL | | 90分 |
| | 2) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ | 1袋 | | 30分 1の側管より |
| Day8、[15] | <main点滴> | | | |
| | 1) ソリタT4 | 200mL | 1V | ナベルピン投与後全開で点滴 |
| | <側管点滴> | | | |
| | 1) 生食 | 50mL | 1V | 約15分 ナベルピン静注前:血管内留置の確認 |
| Day8、[15] | 2) ナベルピン () mg | | | 約5分で静注 Dr. 施行 |
| | 合計30mLになるように生食で溶解 | | | |
| ◆血管炎予防のためナベルピン静注後ソリタT4を全開で輸液する。 ◆Day8は白血球2000/mm ³ 未満または好中球1000/mm ³ 未満は中止 ◆カルボプラチンはAUC=5~6で計算する。(初回投与で問題があれば変更) | | | | |