

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

小細胞肺癌 シスプラチン+ペブシド併用療法



1コース 3週間 (放射線治療施行中は4週間)
CDDPは、Day1に投与
VP-16は、Day1~3に投与

投与開始日	年	月	日	コース予定
● CDDP 80mg/m ² Day 1				
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)		計算量:	mg	投与量: mg
● VP-16 100mg/m ² Day 1~3				
(VP-16: ETP: 一般名エトポシド、商品名ペブシド)		計算量:	mg	投与量: mg

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	
	アロカリス点滴静注235mg	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	2) 生食 500mL	1V	90分
	ペブシド ()mg		
	3) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
4) マンニトールS 300mL	1V	1時間	
5) 生食 350mL		2時間	
シスプラチン ()mg			
6) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間	
7) 生食 500mL	1V	1時間	

【Day2, 3の投与スケジュール】

Day2, 3	1) 生食 100mL	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	4A	
	2) 生食 500mL	1V	90分
ペブシド ()mg			
3) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間	

※飲水励行

⇒Day1: 1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

◆ペブシド: 可塑剤としてDEHPを含むポリ塩化ビニル製点滴セットの使用は避けること。

★Day4: デカドロン[®]の投与を検討する。