

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積 m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

非小細胞肺癌 シスプラチン+アリムタ療法 short hydration

投与開始日 年 月 日 1コース3週間 コース予定

- アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEM: 一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)
- シスプラチン 75mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	30分
	アロカリス点滴静注235mg	1V	
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	2) 生食 100mL	1V	10分
	アリムタ ()mg		
	3) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL	
4) マンニトールS 300mL	1V	1時間	
5) 生食 350mL			
	シスプラチン ()mg	2時間	
	6) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	7) 生食 500mL	1V	

【Day2, 3の投与スケジュール】

Day2, 3	1) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	デキサート注射液1.65mg	4A	
	2) 生食 500mL	1V	1時間

※飲水励行

⇒Day1: 1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

⇒Day2, 3: 外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロンを処方・内服する。

★Day4: デカドロンの投与を検討する。

◆前投薬としての葉酸およびビタミンB12が投与されているか確認。

◆葉酸: アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。

◆ビタミンB₁₂: アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。