

がん化学療法治療計画書 肺がん-(15)2021.8

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( )	薬剤師( )
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

アリムタ単独療法

アリムタ 500mg/m<sup>2</sup>



Day -7                  Day 1                                  21  
 VB<sub>12</sub>(9週毎に筋注)  
 葉酸→連日投与

1コース 3週間

アリムタは、Day1に投与

投与開始日                  年                  月                  日    クール予定

● アリムタ                  500mg/m<sup>2</sup>                  Day 1                  計算量:                  mg                  投与量:                  mg  
(PEM:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)

【投与スケジュール】

Day1	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	4A	
	2) 生食 100mL	1V	10分
	アリムタ ( )mg		
	3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

- ◆ 前投薬としての葉酸およびビタミンB<sub>12</sub>が投与されているか確認。
- ◆ 葉酸: アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。  
 なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ◆ ビタミンB<sub>12</sub>: アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB<sub>12</sub>として1回1mgを筋肉内投与する。  
 その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

特記事項