

がん化学療法治療計画書 肺がん-(16)2018.1

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg	HBV感染スクリーニング <input type="checkbox"/> 確認済み	
体表面積 m ²			

カルセド単独療法

非小細胞肺癌 小細胞肺癌

1コース3週間
カルセドはDay1~3投与

投与開始日 年 月 日 _____ クール予定 _____

●AMR 45mg/m²、 40mg/m²、 35mg/m²
 (AMR:一般名アムルピシン、商品名カルセド) 計算量: _____ mg 投与量: _____ mg

【投与スケジュール】

Day1~3	<main点滴>			
	1) ソリタT4	200mL	1V	2時間 (下記の2)3)4)終了すれば 抜針可)
	<側管点滴>			
	2) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋		30分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A		
	3) 生食	50mL	1V	約5分
	カルセド ()	mg		
4) 生食	100mL	1V	全開	
血管炎予防のため静注後、生食100mLを全開で輸液する。				

【Day4~5の内服薬】※症状に応じて省略可

Day4~5	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
--------	------------	----	----------	-----

特記事項