


がん化学療法治療計画書肺がん-(17)2022.11

|         |   |              |                               |
|---------|---|--------------|-------------------------------|
| 担当医/指導医 |   | /            |                               |
| 目的      | <input type="checkbox"/> 積極的治療  |              | <input type="checkbox"/> 症状緩和 |
|         | <input type="checkbox"/> 術前補助   |              | <input type="checkbox"/> 術後補助 |
| 告知程度    | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 |              |                               |
| 告知内容    | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)  |              |                               |
|         | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する   |              |                               |
| 服薬指導    | <input type="checkbox"/> 依頼する   |              |                               |
|         | 看護師( ) 薬剤師( )   |              |                               |
| 身長: cm  | 体重: Kg  |              |                               |
| 体表面積    | m <sup>2</sup>  | HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み |

肺癌 シスプラチン+カンプト療法 short hydration

CDDP 60mg/m<sup>2</sup> or 80mg/m<sup>2</sup>



小細胞肺癌  非小細胞肺癌

1コース 4週間

CDDPは、Day1に投与

CPT-11は、Day1、8、15に投与

投与開始日 年 月 日 コース予定

●CDDP  60mg/m<sup>2</sup>  80mg/m<sup>2</sup> Day1

(小細胞肺癌: 60mg/m<sup>2</sup>、非小細胞肺癌: 80mg/m<sup>2</sup>)  
(CDDP: 一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)

計算量: mg 投与量: mg

●CPT-11 60mg/m<sup>2</sup> Day 1、8、15

(CPT-11: 一般名イリリネカン、商品名カンプト)

計算量: mg 投与量: mg

【投与スケジュール】

|                   |                                  |          |     |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----|
| Day1              | 1) パロノセトロン点滴静注バッグ<br>0.75mg/50mL | 1V       | 30分 |
|                   | アロカリス点滴静注235mg                   | 1V       |     |
|                   | デキサート注射液1.65mg                   | 6A       |     |
|                   | 2) 生食 500mL                      | 1V       | 90分 |
|                   | カンプト ( )mg                       |          |     |
|                   | 3) YDソリタT3号 500mL                | 1V       | 1時間 |
|                   | 硫酸Mg補正液(1mEq/mL)                 | 8mL      |     |
| 4) マンニトールS 300mL  | 1V                               | 1時間      |     |
| 5) 生食 350mL       |                                  | 2時間      |     |
|                   | シスプラチン ( )mg                     |          |     |
| 6) YDソリタT3号 500mL | 1V                               | 1時間      |     |
| 7) 生食 500mL       | 1V                               | 1時間      |     |
| Day2, 3           | 1) YDソリタT3号 500mL                | 1V       | 1時間 |
|                   | デキサート注射液1.65mg                   | 4A       |     |
| 2) 生食 500mL       | 1V                               | 1時間      |     |
| Day8, 15          | 1) パロノセトロン点滴静注バッグ<br>0.75mg/50mL | 1V       | 30分 |
|                   | デキサート注射液1.65mg                   | 4A       |     |
|                   | 2) 生食 500mL                      | 1V       | 90分 |
|                   | カンプト ( )mg                       |          |     |
| 3) 生食 50mL        | 1V                               | ルートフラッシュ |     |

★Day4: デカドロン<sup>®</sup>の投与を検討する。

※飲水励行

⇒Day1: 1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

⇒Day2、3: 外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロン<sup>®</sup>を処方・内服する。