

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌（原発・再発・進行）	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師（ ） 薬剤師（ ）	
身長： cm	体重： Kg		
体表面積	m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

非小細胞肺癌 タルセバ錠内服療法

投与開始日 年 月 日

- ・切除不能な再発・進行性で、がん化学療法施行後に増悪した非小細胞肺癌
- ・EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な再発・進行性で、がん化学療法未治療の非小細胞肺癌

通常、成人にはエルロチニブとして150mgを、食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

副作用の発現により用量を変更する場合には、50mgずつ減量すること。

特記事項