

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( )	薬剤師( )
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

### 小細胞肺がん カンプト+ベプシド併用療法

VP-16 80mg/m<sup>2</sup>



Day 123 8 15 22



CP-T11 60mg/m<sup>2</sup>

1クール 4週間

CPT-11は、Day1、8、15  
VP-16は、Day1~3投与

投与開始日 年 月 日 クール予定

- CPT-11 60mg/m<sup>2</sup> Day 1、8、15 計算量: mg 投与量: mg  
(CPT-11:一般名イリノテカン、商品名カンプト)
- VP-16 80mg/m<sup>2</sup> Day 1~3 計算量: mg 投与量: mg  
(VP-16:一般名エトポシド、商品名ベプシド)

#### 【投与スケジュール】

Day1	<main点滴>		
	1) ソリタT4 200mL	1V	4時間
	<側管点滴>		
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	3A	30分
	2) 生食 500mL	1V	90分
	カンプト ( ) mg		
	3) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋	30分
	4) 5%Tz 250mL	1V	1時間以上
	ベプシド ( ) mg		
Day2~3	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋	30分
	2) 5%Tz 250mL	1V	1時間以上
	3) 生食20mL	1A	静注 (ルートフラッシュ)
Day8、15	<main点滴>		
	1) ソリタT4 200mL	1V	4時間
	<側管点滴>		
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	3A	30分
	2) 生食 500mL	1V	90分
	カンプト ( ) mg		

- ◆可塑剤としてDEHPを含むポリ塩化ビニル製点滴セットの使用は避けること。
- ◆ベプシド希釈の輸液は体表面積に合わせ、ベプシド100mgあたり250mL以上に設定