

| | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| 担当医/指導医 | / | |
| 目的 | <input type="checkbox"/> 積極的治療 | <input type="checkbox"/> 症状緩和 |
| | <input type="checkbox"/> 術前補助 | <input type="checkbox"/> 術後補助 |
| 告知程度 | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 | |
| 告知内容 | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) | |
| | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する | |
| 服薬指導 | <input type="checkbox"/> 依頼する | |
| | 看護師() | 薬剤師() |
| HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み | |

| | | | |
|------|----------------|-----|----|
| 身長: | cm | 体重: | Kg |
| 体表面積 | m ² | | |

カルボプラチン+アリムタ療法 1コース3週間

投与開始日 年 月 日 コース予定

● アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEM:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)

● カルボプラチン AUC=5 Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

【投与スケジュール】

| | | | |
|------|---------------------------------|----|----------|
| Day1 | 1) パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL | 1V | 15分 |
| | デキサート注射液1.65mg | 6A | |
| | 2) 生食 100mL | 1V | 10分 |
| | アリムタ ()mg | | |
| Day1 | 3) 5%TZ 250mL | 1V | 1時間 |
| | カルボプラチン ()mg | | |
| Day1 | 4) 生食 50mL | 1V | ルートフラッシュ |

【Day2, 3の内服薬】※症状に応じて省略可

| | | | | |
|---------|------------|----|----------|-----|
| Day2, 3 | デカドロン(4mg) | 2錠 | 分2 朝・昼食後 | 2日間 |
|---------|------------|----|----------|-----|

- ◆ 前投薬としての葉酸およびビタミンB₁₂が投与されているか確認。
- ◆ 葉酸: アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
 なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ◆ ビタミンB₁₂: アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
 その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。