


がん化学療法治療計画書 肺がん-(25)2014.3

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

アリムタ+BV療法



投与開始日 年 月 日 クール予定

● アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEMETREXED:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)

● Bevacizumab 15 mg/kg Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(BV:一般名ベバシズマブ、商品名アバスタチン)

【投与スケジュール】

Day1	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ 1袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL 12A	20分
	2) 生食 100mL 1V アリムタ () mg	10分
	3) 生食 100mL 1V	30分
	4) 生食 100mL 1V アバスタチン () mg	投与時間は 下記を参照

- ◆非ステロイド性抗炎症剤の併用には注意！
- ◆前投薬としての葉酸およびビタミンB₁₂が投与されているか確認のこと！
葉酸:アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
ビタミンB₁₂:アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。
- ◆アバスタチンの投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。