

がん化学療法治療計画書 肺がん-(27)2022.1

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

非小細胞肺癌 カルボプラチン+パクリタキセル+アバスチン併用療法

カルボプラチン、パクリタキセル、アバスチンは、Day1に投与。1コース3週間。

投与開始日 年 月 日 コース予定

- PTX 200mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PTX:一般名パクリタキセル、商品名パクリタキセル)
- CBDCA カルバートの計算式(AUC6) Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)
- Bevacizumab 15 mg/kg Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(BV:一般名ベバシズマブ、商品名アバスチン)

【投与スケジュール】

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート注射液1.65mg	12A	
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポララミン 5mg	1A	
	2) 生食 100mL	1V	
アバスチン ()mg			
3) 生食 500mL	1V	3時間 滴下速度調節必要	
パクリタキセル () mg			
4) 生食 250mL	1V	1時間	
カルボプラチン () mg			
5) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

【Day2～3の内服薬】

Day2～3	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
--------	------------	----	----------	-----

- ★ アバスチンの投与時間:
初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- ★ アバスチンの溶解方法:必ず生理食塩液を使用する。本剤とブドウ糖溶液の混合は避ける。
- ★ 専用の点滴セットを使用すること。
(パクリタキセル: DEHPフリー、0.22ミクロン以下のフィルター付き点滴セット)
- ★ パクリタキセル:アルコール過敏症でないことを確認する。

特記事項