


がん化学療法治療計画書 肺がん-(31)2020.6

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

DOC+CBDCA併用療法new



投与開始日 年 月 日 クール予定

- CBDCA カルバートの計算式 Day 1
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン) 計算量: mg 投与量: mg
- DOC 60~70mg/m² Day 1
(DOC:一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテル) 計算量: mg 投与量: mg

【投与スケジュール】

Day1	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ 1袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL 4A ファモチジン静注20mg 1A	30分
	2) 5%Tz 250mL 1V ドセタキセル () mg	1時間
	3) 5%Tz 250mL 1V カルボプラチン () mg	1時間
	4) 生食 20mL 1V	静注(ルートフラッシュ)
	(内服)デカドロン錠 4mg 夕食後 (省略可)	
Day2~3	(内服)デカドロン錠 8mg 分2 朝・夕食後 (省略可)	

- ◆カルボプラチンはAUC=5~6で計算する。(初回投与で問題があれば変更)
- ◆添付の溶解液にはエタノールが含有されているので、必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認
- ◆ドセタキセルは点滴開始から約15分は点滴速度を少し遅めにして、全身状態を観察する。