担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

肺がん S-1+BV併用療法



1クール 3週間
S-1は、2週間内服後、1週間休薬,
BVは、Day1に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● S－1　80mg/m^2　14日間　投与量:　　mg
（1日目の夕～15日目の朝まで投与）

● Bevacizumab　15mg/kg　Day 1　投与量:　　mg　抜き取り量:　　mL
（BV : 一般名ベバシズマブ、商品名アバスチン）
《必要抜き取り量計算式》　１５mg/kgの場合抜き取り量（ｍＬ） ＝ 体重(kg)×０．３

【投与スケジュール】

Day1	1） 生食　100mL　1V ベバシズマブ　（　　）mg	投与時間は 下記を参照

★ 投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。

★ 溶解方法:必ず生理食塩液を使用する。本剤とブドウ糖溶液の混合は避ける。

特記事項