


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師( ) 薬剤師( )	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m <sup>2</sup>		

### CBDCA+アリムタ+BV併用療法

アリムタ 500mg/m<sup>2</sup> ペバシズマブ 15mg/kg

1クール 3週間



投与開始日 年 月 日 クール予定

- CBDCA カルボプラチンの計算式 Day 1 計算量: mg 投与量: mg  
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)
- アリムタ 500mg/m<sup>2</sup> Day 1 計算量: mg 投与量: mg  
(PEMETREXED:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)
- アバスチン 15mg/kg Day 1 計算量: mg 投与量: mg  
(BV:一般名ペバシズマブ、商品名アバスチン)

#### 【投与スケジュール】

Day1	<main点滴>		
	1) EL-3号	500mL	1V 4時間
	<側管点滴>		
	1) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1袋	20分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A	
	2) 生食	100mL	1V 10分
	アリムタ ( ) mg		
3) 生食	250mL	1V 1時間	
	カルボプラチン ( ) mg		
4) 生食	100mL	1V	投与時間は下記を参照
	アバスチン ( ) mg		

- ◆非ステロイド性抗炎症剤の併用には注意!
- ◆前投薬としての葉酸およびビタミンB<sub>12</sub>が投与されているか確認のこと!  
葉酸:アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。  
なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。  
ビタミンB<sub>12</sub>:アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB<sub>12</sub>として1回1mgを筋肉内投与する。  
その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。
- ◆カルボプラチンはAUC=5~6で計算する。(初回投与で問題があれば変更)
- ◆アバスチンの投与時間:初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好で口であれば、2回目の投与は60分間でなくても良い。  
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。