担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する
	看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長：　cm	体重：　Kg
体表面積	m^2

肺癌　カルボプラチン+アブラキサン療法

1コース　3週間

投与開始日　　年　　月　　日　　コース予定

● カルボプラチン　AUC＝6　Day 1　計算量：　mg　投与量：　mg
（一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン）

● アブラキサン　100mg/m^2　Day 1，8，15　計算量：　mg　投与量：　mg
（一般名パクリタキセルアルブミン懸濁型、商品名アブラキサン）

【投与スケジュール】

Day1	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V		15分
	デキサート　1.65mg	6A		
	2） 生食 50mL　（　　）mL		←アブラキサンの濃度が5mg/mLになるように生食の量を調節	液量はアブラキサンの投与量により異なる為速度調節注意！ 30分
	アブラキサン　（　　）mg			
	3） 生食 50mL	1V		ルートフラッシュ
	4） 5%ブドウ糖液 250mL	1V		60分
	カルボプラチン　（　　）mg			
	5） 生食 50mL	1V		ルートフラッシュ

【Day2～3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2～3	デカドロン（4mg）	2錠	分2 朝・昼食後	2日間

Day8，15	1） 生食 50mL	1V		15分
	デキサート　1．65mg	2A		
	2） 生食 50mL　（　　）mL		←アブラキサンの濃度が5mg/mLになるように生食の量を調節	液量はアブラキサンの投与量により異なる為速度調節注意！ 30分
	アブラキサン　（　　）mg			
	3） 生食 50mL	1V		ルートフラッシュ

◆ アブラキサンは、特定生物由来製品（血漿分画製剤）使用に関する説明と同意が必要なため、化学療法・同意書（アブラキサンを含む治療）を使用すること。

◆ アブラキサンは、投与時インラインフィルターを使用しないこと。

特記事項