

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg	HBV感染スクリーニング	
体表面積 m ²		<input type="checkbox"/> 確認済み	

非小細胞肺癌 シスプラチン+アリムタ+キイトルーダ療法 short hydration

投与開始日 年 月 日 1コース3週間 コース予定

- キイトルーダ 200mg/body Day 1 投与量: 200 mg
(一般名:ペムプロリスマブ、商品名:キイトルーダ)
- アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEM:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)
- シスプラチン 75mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(CDDP:一般名シスプラチン、商品名シスプラチン)

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1) 生食 50mL	1V	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	キイトルーダ (200)mg		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	
	アロカリス点滴静注235mg	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	5) 生食 100mL	1V	10分
	アリムタ ()mg		
	6) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	8mL		
7) マンニトールS 300mL	1V	1時間	
8) 生食 350mL		2時間	
シスプラチン ()mg			
9) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間	
10) 生食 500mL	1V	1時間	

【Day2, 3の投与スケジュール】

Day2, 3	1) YDソリタT3号 500mL	1V	1時間
	デキサート注射液1.65mg	4A	
	2) 生食 500mL	1V	1時間

★Day4:デカドロンの投与を検討する。

※飲水励行

⇒Day1:1000mL以上の飲水を行う。飲水できない場合は、生食1L点滴追加等考慮する。

⇒Day2, 3:外来等で点滴を省略する場合は、1000mL以上の飲水を行う。その際は、デカドロンを処方・内服する。