

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

非小細胞肺癌 カルボプラチン+アリムタ+キイトルーダ療法 1コース3週間

投与開始日 年 月 日 コース予定

- キイトルーダ 200mg/body Day 1 投与量: 200 mg
(一般名:ペムプロリスマブ、商品名:キイトルーダ)
- アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEM:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)
- カルボプラチン AUC=5 Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 50mL	1V	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	キイトルーダ (200)mg		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート注射液1.65mg	6A	
	5) 生食 100mL	1V	10分
アリムタ ()mg			
6) 5%TZ 250mL	1V	1時間	
カルボプラチン ()mg			
7) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

【Day2, 3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2, 3	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
---------	------------	----	----------	-----

- ★ キイトルーダは、0. 2~5 μ mのインラインフィルター付きの点滴セットを使用すること。
- ◆ 前投薬としての葉酸およびビタミンB₁₂が投与されているか確認。
- ◆ 葉酸: アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0. 5mgを連日経口投与する。
 なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ◆ ビタミンB₁₂: アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
 その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。