

がん化学療法治療計画書 肺がん-(47) 2020.5

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

非小細胞肺癌 アリムタ+キイトルーダ療法 1コース3週間

投与開始日 年 月 日 コース予定

- キイトルーダ 200mg/body Day 1 投与量: 200 mg
(一般名:パンプロリズマブ、商品名:キイトルーダ)
- アリムタ 500mg/m² Day 1 計算量: mg 投与量: mg
(PEM:一般名ペメトレキセド、商品名アリムタ)

【投与スケジュール】

Day 1	1) 生食 50mL	1V	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	キイトルーダ (200)mg		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) 生食 50mL	1V	15分
	デキサート注射液1.65mg	4A	
5) 生食 100mL	1V	10分	
アリムタ ()mg			
6) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

- ★ キイトルーダは、0.2~5μmのインラインフィルター付きの点滴セットを使用すること。
- ◆ 前投薬としての葉酸およびビタミンB₁₂が投与されているか確認。
- ◆ 葉酸:アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ◆ ビタミンB₁₂:アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。