

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

非小細胞肺癌 カルボプラチン+パクリタキセル+アバスチン+テセントリク療法
1コース3週間

投与開始日	年	月	日	コース予定
● テセントリク	1200mg/body	Day 1		投与量: 1200 mg
(一般名:アテゾリズマブ、商品名:テセントリク)				
● アバスチン	15mg/kg	Day 1		計算量: mg 投与量: mg
(BV、Bmab:一般名ババシズマブ、商品名アバスチン)				
● パクリタキセル	175mg/m ²	Day 1		計算量: mg 投与量: mg
(PTX:一般名パクリタキセル、商品名パクリタキセル) IMpower150試験では、PTX 200mg/m ²				
● カルボプラチン	AUC=5	Day 1		計算量: mg 投与量: mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン) IMpower150試験では、CBDCA AUC6				

【投与スケジュール】

Day	投与内容	用量	時間
Day 1	1) 生食	50mL	1V
	2) 生食	250mL	1V
		テセントリク (1200)mg	60分
			投与時間は下記を参照
	3) 生食	50mL	1V
			2)のルートフラッシュ
	4) 生食	100mL	1V
		アバスチン ()mg	90分
			投与時間は下記を参照
	5) パロセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	1V
	デキサート注射液1.65mg	12A	15分
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポラミン 5mg	1A	
	6) 生食	50mL	1V
	7) 生食	500mL	1V
		パクリタキセル ()mg	3時間
			滴下速度調節必要
	8) 5%TZ	250mL	1V
		カルボプラチン ()mg	1時間
	9) 生食	50mL	1V
			ルートフラッシュ

【Day2, 3の内服薬】※症状に応じて省略可

Day2, 3	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
---------	------------	----	----------	-----

- ♥ テセントリク投与時は、0. 2~0. 22 μ mのインラインフィルターを使用すること。
- ♥ テセントリクの投与時間
- ♥ 初回投与時は60分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。
- ★ アバスチンの投与時間
- ★ 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- ◆ パクリタキセルは、DEHPフリー、0. 22ミクロン以下のフィルター付き点滴セットを使用すること。
- ◆ パクリタキセル:アルコール過敏症でないことを確認する。