

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

小細胞肺癌 カルボプラチン+ペプシド+テセントリク療法 1コース 3週間

投与開始日 年 月 日 コース予定

● テセントリク	1200mg/body	Day 1	計算量:	mg	投与量:	1200	mg
(一般名:アテゾリズマブ、商品名:テセントリク)							
● カルボプラチン	AUC=5	Day 1	計算量:	mg	投与量:	mg	mg
(CBDCA:一般名カルボプラチン、商品名カルボプラチン)							
● ペプシド	100mg/m ²	Day 1, 2, 3	計算量:	mg	投与量:	mg	mg
(ETP,VP-16:一般名イトボシド、商品名ペプシド)							

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 50mL	1V	
	2) 生食 250mL	1V	60分 投与時間は下記を参照
	テセントリク (1200)mg		
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート 1.65mg	6A	
	5) 5%ブドウ糖液 250mL	1V	60分
カルボプラチン ()mg			
6) 生食 500mL	1V	90分	
ペプシド ()mg			
7) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	
Day2, 3	1) 生食 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	4A	
	2) 生食 500mL	1V	90分
ペプシド ()mg			
3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

♥ テセントリク投与時は、0. 2~0. 22 μmのインラインフィルターを使用すること。

テセントリクの投与時間

♥ 初回投与時は60分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。

♣ ペプシド: DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。