

非小細胞肺癌 カルボプラチン+アリムタ+オブジーボ+ヤーボイ療法

【投与スケジュール】Day22-42

| | | | |
|-------|--|----------|-------------|
| Day22 | 1) 生食 50mL | 1V | ルートキープ |
| | 2) 生食 100mL オブジーボ (360)mg | 1V | 1時間 |
| | 3) 生食 50mL | 1V | 2)のルートフラッシュ |
| | 4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注射液1.65mg | 1V 6A | 15分 |
| | 5) 生食 100mL アリムタ ()mg | 1V | 10分 |
| | 6) 5%TZ 250mL カルボプラチン ()mg | 1V | 1時間 |
| | 7) 生食 50mL | 1V | ルートフラッシュ |

【Day23, 24の内服薬】症状に応じて省略可

| | | | | |
|-----------|------------|----|----------|-----|
| Day23, 24 | デカドロン(4mg) | 2錠 | 分2 朝・昼食後 | 2日間 |
|-----------|------------|----|----------|-----|

- オブジーボ・ヤーボイ+2サイクル化学療法併用療法(カルボプラチン+アリムタ)投与後は、オブジーボ・ヤーボイ併用療法(レジメン、がん化学療法治療計画書 免疫-⑤または⑥)へ。
- ★ オブジーボ投与時は、インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を用いて点滴静注
- ❁ ヤーボイ投与時は、インラインフィルター(0.2~1.2 μ mのメンブランフィルター)を用いて点滴静注
- ◆ 前投薬としての葉酸およびビタミンB₁₂が投与されているか確認。
- ◆ 葉酸:アリムタ初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
なお、アリムタの投与を中止又は終了する場合には、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ◆ ビタミンB₁₂:アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

特記事項

★治療スケジュール

