

非小細胞肺癌 カルボプラチン+パクリタキセル+オプジーボ+ヤーボイ療法

【投与スケジュール】Day22-42

Day22	1) 生食 50mL	1V	ルートキープ
	2) 生食 100mL オプジーボ (360)mg	1V	1時間
	3) 生食 50mL	1V	2)のルートフラッシュ
	4) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート注射液1.65mg	12A	
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポラミン 5mg	1A	
	5) 生食 50mL	1V	30分
6) 生食 500mL パクリタキセル ()mg	1V	3時間 滴下速度調節必要	
7) 5%TZ 250mL カルボプラチン ()mg	1V	1時間	
8) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

全量100mLになるように、生食の量を調節

【Day23, 24の内服薬】症状に応じて省略可

Day23, 24	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
-----------	------------	----	----------	-----

- オプジーボ・ヤーボイ+2サイクル化学療法併用療法(カルボプラチン+パクリタキセル)投与後は、オプジーボ・ヤーボイ併用療法(レジメン、がん化学療法治療計画書 免疫-⑤または⑥)へ。
- ★ オプジーボ投与時は、インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を用いて点滴静注
- ☘ ヤーボイ投与時は、インラインフィルター(0.2~1.2 μ mのメンブランフィルター)を用いて点滴静注
- ◆ パクリタキセルは、DEHPフリー、0.22ミクロン以下のフィルター付き点滴セットを使用すること。
- ◆ パクリタキセル: アルコール過敏症でないことを確認する。

特記事項

★治療スケジュール

