がん化学療法治療計画書 乳癌-① 2022.1

担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

乳癌　AC療法

（投与日:Day1，　1クール:21日）

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● アドリアシン　60mg/m^2　Day 1　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（DXR：一般名ドキソルビシン、商品名アドリアシン）

● エンドキサン　600mg/m^2　Day 1　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（CPA：一般名シクロホスファミド、商品名エンドキサン）

【Day1の投与スケジュール】

Day1	内服薬　アプレピタントcp125mg　アドリアシン開始1時間前に服用		
	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1V	15分
	デキサート　1．65mg	6A	
	2） 生食　50mL	1V	15分
	アドリアシン　（　　）mg		
	3） 生食　250mL	1V	1時間
	エンドキサン　（　　）mg		
	4） 生食　50mL	1V	ルートフラッシュ

【Day2～4の内服薬】

Day2～3	アプレピタント（80mg）	1cp	午前中	2日間
Day2～4	デカドロン（4mg）	2錠	分2 朝・昼食後	3日間

★ アドリアシン投与開始前に心機能に問題がないこと（駆出率EF50%以上）を確認する。

★ 蓄積性心毒性予防のため、アドリアシンの総投与量は、450～500mg/m^2までに留める。

★ エンドキサンの溶解には、生食を使用すること。（100mg1Vに生食5mLを加えて溶解する）

特記事項