

担当医/指導医		/
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和	
	<input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助	
投与場所	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 入院→外来 <input type="checkbox"/> 外来	
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
身長: cm 体重: Kg	服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する
体表面積 m ²		看護師() 薬剤師()

乳癌 ハーセプチン療法【毎週】

投与開始日 年 月 日

● ハーセプチン 初回 4mg/kg 毎週1回 投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL

<体重あたりの換算式> 初回 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 4 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$

● ハーセプチン 2回目以降 2mg/kg 毎週1回 投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL

<体重あたりの換算式> 2回目以降 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 2 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$

【投与スケジュール】

初回	生食 250mL ハーセプチン ()mg	1V 90分
2回目以降	生食 250mL ハーセプチン ()mg	1V 90分

- ★ 初回投与時には4mg/kg(体重)を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。
- ★ 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- ★ Infusion reaction に注意！
解熱鎮痛剤(NSAID)の坐薬をハーセプチン投与30分前に投与することを(特に初回)考慮する。
- ★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。

特記事項