

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
身長: cm 体重: Kg		
体表面積 m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

乳癌 ハーセプチン+weeklyパクリタキセル療法

ハーセプチン:毎週投与 , パクリタキセル:3週weekly投薬、1週休薬 (※Day22は休薬)

投与開始日 年 月 日 クール予定

● ハーセプチン 初回 4mg/kg 毎週1回 投与量: mg 抜き取り量: mL

<体重あたりの換算式> 初回 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 4 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$

● ハーセプチン 2回目以降 2mg/kg 毎週1回 投与量: mg 抜き取り量: mL

<体重あたりの換算式> 2回目以降 抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 2 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$

● パクリタキセル 80mg/m² Day 1, 8, 15 計算量: mg 投与量: mg
(一般名:パクリタキセル、商品名:パクリタキセル)

【投与スケジュール】

Day1, 8, 15, 22	1) 生食 250mL ハーセプチン ()mg	1V	90分
パクリタキセルの投与はハーセプチン投与24時間後に実施し、良好な認容性が確認された後は、2回目以降の投与では、ハーセプチン投与直後に実施する			
Day1, 8, 15 (初回:Day2, 8, 15)	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	
	デキサート 1.65mg	5A	30分
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポラミン 5mg	1A	
	2) 生食 100mL プリンペラン 10mg	1V	30分
	3) 5%ブドウ糖液 250mL パクリタキセル ()mg	1V	1時間 滴下速度調節必要
	4) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ