担当医 /指導医	/
目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和
	□ 術前補助 □ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌(原発 ・ 再発 ・ 進行)
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師( ) 薬剤師( )

身長: cm 体重: Kg		HBV感染スクリーニング	□ 確認済み
体表面積 m^2			

乳癌 カペシタビン療法

投与開始日 年 月 日　　内服予定期間 ( )

□ A法 21日間連日内服、7日間休薬 (副作用に応じて投与間隔変更することあり)

体表面積(m^2)	投与量
□ 1．31未満	1800mg/day (朝900mg, 夕900mg)
□ 1．31以上～1．64未満	2400mg/day (朝1200mg, 夕1200mg)
□ 1．64以上	3000mg/day (朝1500mg, 夕1500mg)
□ その他	( )mg/day (朝 mg, 夕 mg)

□ B法 14日間連日内服、7日間休薬 (副作用に応じて投与間隔変更することあり)

体表面積(m^2)	投与量
□ 1．33未満	3000mg/day (朝1500mg, 夕1500mg)
□ 1．33以上～1．57未満	3600mg/day (朝1800mg, 夕1800mg)
□ 1．57以上～1．81未満	4200mg/day (朝2100mg, 夕2100mg)
□ 1．81以上	4800mg/day (朝2400mg, 夕2400mg)
□ その他	( )mg/day (朝 mg, 夕 mg)

特記事項