担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

乳癌　ナベルビン療法

投与日:Day1，8　1クール:21日　※Day15は、休薬

投与開始日　　年　　月　　日　　投与予定期間（　　）

● ナベルビン　　25mg/m^2　Day 1，8　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（一般名:ビノレルビン、 商品名:ナベルビン）

【投与スケジュール】

Day1，8	ソリタT4　200mL	1V	メイン	ナベルビン投与後全開で点滴
	1） 生食　50mL	1V	側管	約15分間で点滴 （ナベルビン投与前: 血管内留置の確認）
	2） 合計30mLになるように生食で溶解 ナベルビン　（　　）mg		側管	約5分間で静注

★ ナベルビン投与前に、正確に血管が確保されていることを確認すること。

★ ナベルビンは、海外で6分以上の投与により静脈炎多発しているため、約5分間で投与すること。

★ 血管炎予防のため、ナベルビン投与後、ソリタT4200mLを全開で投与する。

特記事項