

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積 m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

乳癌 TC療法

(投与日: Day1, 1クール: 21日)

投与開始日	年	月	日	クール予定
● ドセタキセル	75mg/m ²	Day 1	計算量: mg	投与量: mg
(DTX: 一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテル)				
● インドキサン	600mg/m ²	Day 1	計算量: mg	投与量: mg
(CPA: 一般名シクロホスファミド、商品名インドキサン)				

【Day1の投与スケジュール】

Day1	1) パロノセトロン点滴静注バッグ	0.75mg/50mL	1V	
	デキサート	1.65mg	6A	15分
	ファモチジン静注	20mg	1A	
	ポララミン	5mg	1A	
	2) 生食	100mL	1V	30分
	プリンペラン	10mg	2A	
	3) 生食	250mL	1V	1時間
	ドセタキセル	()mg		
	4) 生食	100mL	1V	15分
	インドキサン	()mg		
5) 生食	50mL	1V	ルートフラッシュ	

【Day2~3の内服薬】

Day2~3	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	2日間
--------	------------	----	----------	-----

- ★ アルコール過敏症でないことを確認する。(添付溶解液には、エタノールが含有されている)
- ★ ドセタキセル点滴開始から約10分間は、点滴速度を少し遅めにして全身状態を観察する。
- ★ 必要に応じ、便秘対策をおこなう。
- ★ インドキサンの溶解には、生食を使用すること。(100mg1Vに生食5mLを加えて溶解する)

特記事項