

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師( ) 薬剤師( )	
身長: cm 体重: Kg			
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

乳癌 ハーセプチン毎週+カペシタビン 【HX療法】			
投与開始日 年 月 日			
●	ハーセプチン	初回 4mg/kg 毎週1回	投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL
		<体重あたりの換算式> 初回	抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 4 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$
●	ハーセプチン	2回目以降 2mg/kg 毎週1回	投与量: _____ mg 抜き取り量: _____ mL
		<体重あたりの換算式> 2回目以降	抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重(kg)} \times 2 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$
●	カペシタビン		
	<input type="checkbox"/> A法 21日間連日内服、7日間休薬 (副作用に応じて投与間隔変更することあり)		
	体表面積(m <sup>2</sup> ) _____		投与量 _____
<input type="checkbox"/>	1. 31未満	1800mg/day (朝900mg, 夕900mg)	
<input type="checkbox"/>	1. 31以上~1. 64未満	2400mg/day (朝1200mg, 夕1200mg)	
<input type="checkbox"/>	1. 64以上	3000mg/day (朝1500mg, 夕1500mg)	
<input type="checkbox"/>	その他	( )mg/day (朝 _____ mg, 夕 _____ mg)	
	<input type="checkbox"/> B法 14日間連日内服、7日間休薬 (副作用に応じて投与間隔変更することあり)		
	体表面積(m <sup>2</sup> ) _____		投与量 _____
<input type="checkbox"/>	1. 33未満	3000mg/day (朝1500mg, 夕1500mg)	
<input type="checkbox"/>	1. 33以上~1. 57未満	3600mg/day (朝1800mg, 夕1800mg)	
<input type="checkbox"/>	1. 57以上~1. 81未満	4200mg/day (朝2100mg, 夕2100mg)	
<input type="checkbox"/>	1. 81以上	4800mg/day (朝2400mg, 夕2400mg)	
<input type="checkbox"/>	その他	( )mg/day (朝 _____ mg, 夕 _____ mg)	
【ハーセプチン 投与スケジュール】			
初回	生食 250mL	1V	90分
	ハーセプチン ( )mg		
2回目以降	生食 250mL	1V	90分
	ハーセプチン ( )mg		
★ 初回投与時には4mg/kg(体重)を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。			
★ Infusion reaction に注意! 解熱鎮痛剤(NSAID)の坐薬をハーセプチン投与30分前に投与することを(特に初回)考慮する。			
★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。			