## がん化学療法治療計画書 乳癌-(16) 2017.10

	担当医/指導医	/
	目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和
		□ 術前補助 □ 術後補助
	<del>告</del> 知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
	告知内容	□ 癌(原発・再発・進行)
	급재연습	□ 抗癌剤を使用する
	印本七语	□ 依頼する
身長: cm 体重: Kg	服薬指導	看護師( ) 薬剤師( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
体表面積 m <sup>2</sup>	HBV感染スク	リーニング ロ 確認済み

体表面積	m <sup>2</sup>	HBV感染スク	リーニング 口 確認済み	
アブラキサン(3週間毎)療法				
アブラキサン 260mg/m² ↓ Day 1		1クール 3遅 アブラキサン	<sup>退間</sup> は、Day1に投与	
投与開始	3 年 月 日		クール予定	
	v 260mg/m <sup>2</sup> Day 1 タキセル(アルブミン懸濁型)、商品名アブラキ・		mg 投与量: mg	
【Day1の投与スケジュール】				
	1)生食 100mL	1V	30分	
Day1	デキサート 1.65mg	4A	30 <del>7</del>	
	2)生食 100mL (	)mL	30分で点滴 ただし液量はアブラキサンの投与量により	
	アブラキサン(	)mg	異なる為速度調節注意!(5mg/mL)	
	3)生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	
◆アブラキサンは化学療法治療同意書の他に特定生物由来製品(血漿分画製剤)使用に関する説明と同意書も必要です。				
◆投与時インラインフィルターは使用しないこと。				
特記事項	◆投与量減量の目安	減量段階	投与量	
		通常投与量	260mg/m <sup>2</sup>	
		1段階減量	220mg/m <sup>2</sup>	
		2段階減量	180mg/m <sup>2</sup>	