


担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師() 薬剤師()	
身長: cm 体重: Kg		
体表面積 m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

アブラキサン+ハーセプチン療法



投与開始日	年	月	日	クール予定
● ハーセプチン	初回	4mg/kg	毎週1回	投与量: mg 抜き取り量: mL
<体重あたりの換算式>		初回	抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 4 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$	
● ハーセプチン	2回目以降	2mg/kg	毎週1回	投与量: mg 抜き取り量: mL
<体重あたりの換算式>		2回目以降	抜き取り量(mL) = $\frac{\text{体重 (kg)} \times 2 \text{ (mg/kg)}}{21 \text{ (mg/mL)}}$	
● アブラキサン	260mg/m ²	Day 1	計算量: mg	投与量: mg
(一般名パクリタキセル(アルブミン懸濁型)、商品名アブラキサン)				

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 250mL	1V	90分
	ハーセプチン 初回 ()mg		初回投与の忍容性が良好 であれば30分間まで短縮可能
	2回目以降 ()mg		
	2) 生食 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	6A	
Day8, 15	3) 生食 100mL ()mL		30分で点滴 ただし液量はアブラキサンの投与量により 異なる為速度調節注意!(5mg/mL)
	アブラキサン ()mg		
Day8, 15	4) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ
	1) 生食 250mL	1V	90分
	ハーセプチン ()mg		初回投与の忍容性が良好 であれば30分間まで短縮可能

特記事項	◆アブラキサンは化学療法治療同意書の他に特定生物由来製品(血漿分画製剤)使用に関する説明と同意書も必要です。	
	◆投与時インラインフィルターは使用しないこと。	
	◆投与量減量の目安	
	減量段階	投与量
	通常投与量	260mg/m ²
	1段階減量	220mg/m ²
	2段階減量	180mg/m ²