担当医/指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和 □ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ） □ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積	m^2

乳癌　weeklyパクリタキセル+BV療法

投与開始日　　年　　月　　日

PTX 90mg/m²

Day 1　8　15　22

BV 10mg/kg

クール予定

1クール 4週間
PTXは、Day1、8、15
BVはDay1、15
Day22は休薬

●パクリタキセル 90mg/m^2　Day 1, 8, 15　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（一般名：パクリタキセル、 商品名：パクリタキセル）

●Bevacizumab　10 mg/kg　Day 1, 15　計算量:　　mg　投与量:　　mg
（BV ： 一般名ベバシズマブ、商品名アバスチン）

【投与スケジュール】

Day1, 15	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1. 65mg	5A	
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポララミン 5mg	1A	
	2） 生食 100mL	1V	30分
	プリンペラン 10mg	2A	
	3） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	1時間
	パクリタキセル （	)mg	滴下速度調節必要
	4） 生食 50mL	1V	15分
	5） 生食 100mL	1V	投与時間は
	アバスチン （	)mg	下記を参照
	6） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ
Day8	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1. 65mg	5A	
	ファモチジン静注20mg	1A	
	ポララミン 5mg	1A	
	2） 生食 100mL	1V	30分
	プリンペラン 10mg	2A	
	3） 5%ブドウ糖液 250mL	1V	1時間
	パクリタキセル （	)mg	滴下速度調節必要
	4） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ 専用の点滴セットを使用すること。（DEHPフリー、0. 22ミクロン以下のフィルター付きの点滴セット）

★ パクリタキセルは、過敏症、ショックに注意！
（投与開始後から1時間、特に10分以内は患者の状態を十分に観察すること）

★ アルコール過敏症でないことを確認する。

★ デキサートとパクリタキセルは少なくとも30分は間隔を空けて投与する。

★ weeklyパクリタキセルの前投薬のデキサートは、初回導入時必ずデキサメタゾンとして8mg投与すること。
次回投与時までに過敏症状の発現が見られなかった場合又は臨床上特に問題のない過敏症状の場合は、2週目の投与より半量（4mg）に減量可。
以降の投与週においても同様の場合、半量ずつ最低1mgまで減量して投与してもよい。

★ アバスチンの投与時間：初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。