担当医/指導医	／
目的	☐ 積極的治療　☐ 症状緩和
	☐ 術前補助　☐ 術後補助
告知程度	☐全告知 ☐部分告知 ☐未告知
告知内容	☐ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	☐ 抗癌剤を使用する
服薬指導	☐ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）

身長: cm 体重: Kg		HBV感染スクリーニング	☐ 確認済み
体表面積 m^2			

乳癌　ハーセプチン毎週＋S-1療法

投与開始日　　年　　月　　日

● ハーセプチン　初回　4mg/kg　毎週1回　投与量:　　mg　抜き取り量:　　mL

＜体重あたりの換算式＞　初回　抜き取り量(mL)＝ $\frac{\text{体重（kg）} \times 4\ \text{(mg/kg)}}{21\ \text{(mg/mL)}}$

● ハーセプチン　2回目以降　2mg/kg　毎週1回　投与量:　　mg　抜き取り量:　　mL

＜体重あたりの換算式＞　2回目以降　抜き取り量(mL)＝ $\frac{\text{体重（kg）} \times 2\ \text{(mg/kg)}}{21\ \text{(mg/mL)}}$

● S-1　☐ 28日連続内服、14日休薬　☐ 14日連続内服、7日休薬

体表面積(m^2)	投与量
☐ 1．25未満	80mg/day（朝40mg，夕40mg）
☐ 1．25以上～1．5未満	100mg/day（朝50mg，夕50mg）
☐ 1．5以上	120mg/day（朝60mg，夕60mg）
☐ その他	（　　）mg/day（朝　　mg，夕　　mg）

【ハーセプチン　投与スケジュール】

初回	生食　250mL	1V	90分
	ハーセプチン　（　　）mg		
2回目以降	生食　250mL	1V	30～90分
	ハーセプチン　（　　）mg		

★ 初回投与時には4mg/kg(体重)を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。

★ 初回投与の忍容性が良好であれば，2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

★ Infusion reaction に注意！
解熱鎮痛剤(NSAID)の坐薬をハーセプチン投与30分前に投与することを(特に初回)考慮する。

★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。