

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌( 原発・再発・進行 )	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師( ) 薬剤師( )	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

**乳癌 HP+ドセタキセル療法 (ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル)**

ハーセプチン、パージェタ、ドセタキセルは、Day1に投与。1コース 21日

投与開始日 年 月 日

● パージェタ	初回	840mg	Day 1	投与量:	840	mg/ 28 mL
● パージェタ	2回目以降	420mg	Day 1	投与量:	420	mg/ 14 mL
● ハーセプチン	初回	8mg/kg	Day 1	投与量:	mg	抜き取り量: mL
● ハーセプチン	2回目以降	6mg/kg	Day 1	投与量:	mg	抜き取り量: mL
● ドセタキセル		75mg/m <sup>2</sup>	Day 1	計算量:	mg	投与量: mg

(DOC: 一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテル)

**【投与スケジュール】**

Day1	1) 生食 50mL	1V	全開
	2) 生食 250mL	1V	60分 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能
	パージェタ 初回840mg, 2回目以降420mg		
	3) 生食 250mL	1V	90分 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能
	ハーセプチン ( )mg		
	4) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1V	30分
デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A		
5) 5%Tz 250mL	1V	1時間	
ドセタキセル ( ) mg			
6) 生食 50mL	1V	全開 (ルートフラッシュ)	

< ハーセプチン、パージェタ >

- ★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。
- ★ Infusion reaction に注意!

< ドセタキセル >

- ★ エタノールが含有されているので、必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認する。