

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積	m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

乳癌 ハーセプチン+ドセタキセル療法

ハーセプチン、ドセタキセルは、Day1に投与。1コース 21日

投与開始日	年	月	日	コース予定
● ハーセプチン	初回	8mg/kg	Day 1	投与量: mg 抜き取り量: mL
● ハーセプチン	2回目以降	6mg/kg	Day 1	投与量: mg 抜き取り量: mL
● ドセタキセル		75mg/m ²	Day 1	計算量: mg 投与量: mg

(DOC: 一般名ドセタキセル、商品名ワンタキソテル)

【投与スケジュール】

Day1	1) 生食 50mL	1V	全開 (ルートキープ用)
	2) 生食 250mL	1V	90分 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能
	ハーセプチン ()mg		
	3) 生食 50mL	1V	15分 (ハーセプチンを投与した方のルートから)
	4) グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	1V	30分
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	4A	
	5) 5%Tz 250mL	1V	1時間
	ドセタキセル ()mg		
	6) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ
	(内服)デカドロン錠 4mg 夕食後 (省略可)		
Day2~3	(内服)デカドロン錠 8mg 分2 朝・夕食後 (省略可)		

< ハーセプチン >

- ★ 投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。
- ★ Infusion reaction に注意!

< ドセタキセル >

- ★ エタノールが含有されているので、必ず問診によりアルコール過敏の有無を確認する。