担当医 /指導医	/
目的	□ 積極的治療　□ 症状緩和
	□ 術前補助　□ 術後補助
告知程度	□全告知　□部分告知　□未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（　　）　薬剤師（　　）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長:　　cm	体重:　　Kg
体表面積　　m^2	

イブランス + フェソロデックス療法

投与開始日　　年　　月　　日　　1コース 4週間

● イブランス　1日1回125mgを3週間経口投与し、その後1週間休薬　投与量:　　mg
（一般名：パルボシクリブ、商品名:イブランス）

● フェソロデックス　500mgを初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回、左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
（一般名：フルベストラント、商品名：フェソロデックス）

【投与スケジュール】

1）フェソロデックス筋注250mg　2筒　初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与

◆ 閉経前乳癌に対しては、LH-RHアゴニストを併用すること。

● イブランスを減量して投与を継続する場合の投与量

減量レベル	投与量
通常投与量	125mg/日
一次減量	100mg/日
二次減量	75mg/日

✖ フェソロデックス筋注は、1回の投与で2筒を一側の臀部に投与しないこと。
硬結に至ることがあるので、注射部位を毎回変更するなど十分に注意して投与すること。
注射は、1-2分かけて緩徐に行うことが望ましい。

特記事項