がん化学療法治療計画書 乳癌-(29)2022.8

	担当医 /指導医	/
	目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和 □ 術前補助 □ 術後補助
	告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
	口州任人	□ 癌(原発・再発・進行)
	告知内容	□ 抗癌剤を使用する
	服薬指導	□ 依頼する
身長: cm 体重: Kg	派不归子	看護師() 薬剤師()
体表面積 m ²	HBV感染ス	クリーニング ロ 確認済み
フェソロデックス療法		
投与開始日 年 月 日		
● フェソロデックス 500mgを初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回、左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 (一般名:フルベストラント、商品名:フェソロデックス)		
【投与スケジュール】		
1) フェソロデックス筋注250mg	2筒	初回、2週後、4週後、その後4週ごとに 1回左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
 ■ フェソロデックス筋注は、1回の投与で2筒を一側の臀部に投与しないこと。		
 硬結に至ることがあるので、注射部位を毎回変更するなど十分に注意して投与すること。		
注射は、1−2分かけて緩徐に行うことが望ましい。		
特記事項		