

担当医 /指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長: cm 体重: Kg

体表面積 m²

レンビマ(レンバチニブ)療法

投与開始日 年 月 日 内服予定期間 ()

切除不能な肝細胞癌

通常、成人には体重にあわせてレンバチニブとして体重60kg以上の場合は12mg、
体重60kg未満の場合は8mgを1日1回、経口投与する。なお、患者の状態により適
宜減量する。

【減量段階基準】

	投与量	
	体重60kg以上	体重60kg未満
開始用量	1回12mg/日	1回8mg/日
1段階減量	1回8mg/日	1回4mg/日
2段階減量	1回4mg/日	1回4mg/隔日
3段階減量	1回4mg/隔日	投与中止

特記事項