

		担当医/指導医	/
		目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療 <input type="checkbox"/> 症状緩和 <input type="checkbox"/> 術前補助 <input type="checkbox"/> 術後補助
		告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知
		告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する
身長: cm 体重: Kg		服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する 看護師() 薬剤師()
体表面積 m ²		HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

ゲムシタピン療法

3週weekly投薬、1週休薬 ※Day22は休薬

膵癌 胆道癌

投与開始日 年 月 日 投与予定期間()

● ゲムシタピン 1000mg/m² Day 1, 8, 15 計算量: mg 投与量: mg
(一般名:塩酸ゲムシタピン、商品名:ゲムシタピン)

【投与スケジュール】

Day1, 8, 15	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	4A	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	ゲムシタピン ()mg		
	3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ ゲムシタピン200mgバイアルは5mL以上、1000mgバイアルは25mL以上の生食に溶解。

特記事項