担当医/指導医	/
目的	☐ 積極的治療　☐ 症状緩和
	☐ 術前補助　☐ 術後補助
告知程度	☐全告知 ☐部分告知 ☐未告知
告知内容	☐ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	☐ 抗癌剤を使用する
服薬指導	☐ 依頼する 看護師（　　） 薬剤師（　　）

身長: cm	体重: Kg	HBV感染スクリーニング	☐ 確認済み
体表面積	m^2		

ゲムシタビン＋S-1療法-②（千葉大学）

☐ 膵癌　　☐ 胆道癌



1クール 21日
S－1は、2週間内服後、1週間休薬,
ゲムシタビンは、Day8と15に投与

投与開始日　　年　　月　　日　　クール予定

● S－1　60mg/m^2　Day 1～14　計算量:　mg　投与量:　mg

● ゲムシタビン　1000mg/m^2　Day 8，15　計算量:　mg　投与量:　mg
（一般名:塩酸ゲムシタビン、 商品名:ゲムシタビン）

【Day8，15の投与スケジュール】

Day8，15	1） グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1．65mg	4A	
	2） 生食 100mL	1V	30分
	ゲムシタビン （	)mg	
	3） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ

★ ゲムシタビン200mgバイアルは5mL以上、1000mgバイアルは25mL以上の生食に溶解。

特記事項