

担当医/指導医	/	
目的	<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
	<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度	<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容	<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
	<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 依頼する	
	看護師()	薬剤師()
HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み	

身長:	cm	体重:	Kg
体表面積	m ²		

膵癌 FOLFIRINOX療法 (インフューザーポンプ使用)



1クール 2週間

投与開始日	年	月	日	クール予定	
● L-OHP	85mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
(L-OHP: 一般名オキサリプラチン、商品名エルプラット)					
● レボホリナート	200mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● CPT-11	180mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
(CPT-11: 一般名イリノテカン、商品名カンプト)					
● 5-FU(急速静注)	400mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
● 5-FU(持続静注)	2400mg/m ²	計算量:	mg	投与量:	mg
(5-FU: 一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル)					

【投与スケジュール】

内服薬 アプレピタントcp125mg エルプラット開始1時間~1時間30分前に服用		本管	側管
Day1~3	15分	1) パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1V デキサート 1.65mg 5A	《3-1)と3-2)→3-3)は同時に投与》 3-2) 生食 100mL 1V 3-3) 5%TZ 250mL 1V ブスコパン 20mg 1A カンプト ()mg
	2時間	2) 5%TZ 250mL 1V エルプラット ()mg	
	2時間	3-1) 5%TZ 250mL 1V	
		レボホリナート ()mg	
	90分	4) 生食 30mL bolus5-FU ()mg	
	インフューザー 46時間	5) 生食 100mL 2V 5-FU ()mg	
		6) ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL 1A	

【Day2~4の内服薬】

Day2~3	アプレピタント(80mg)	1cp	午前中	2日間
Day2~4	デカドロン(4mg)	2錠	分2 朝・昼食後	3日間