

担当医/指導医		/	
目的		<input type="checkbox"/> 積極的治療	<input type="checkbox"/> 症状緩和
		<input type="checkbox"/> 術前補助	<input type="checkbox"/> 術後補助
告知程度		<input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知	
告知内容		<input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行)	
		<input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する	
服薬指導		<input type="checkbox"/> 依頼する	
		看護師() 薬剤師()	
身長: cm	体重: Kg		
体表面積	m ²	HBV感染スクリーニング	<input type="checkbox"/> 確認済み

膵癌 ゲムシタビン + タルセバ療法 1コース4週間

投与開始日 年 月 日

● ゲムシタビン 1000mg/m² Day 1, 8, 15 計算量: mg 投与量: mg
 (一般名:塩酸ゲムシタビン、商品名:ゲムシタビン)

● タルセバ 通常、成人にはタルセバとして100mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
 (一般名:エルロチニブ、商品名:タルセバ)

【投与スケジュール】

Day1, 8, 15	1) グラニセトロン点滴静注液 3mg 100mL	1V	30分
	デキサート 1.65mg	4A	
	2) 生食 100mL	1V	30分
	ゲムシタビン ()mg		
3) 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ	

★ ゲムシタビン200mgバイアルは5mL以上、1000mgバイアルは25mL以上の生食に溶解。

特記事項