


| | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 担当医/指導医 | | / | |
| 目的 | <input type="checkbox"/> 積極的治療 | | <input type="checkbox"/> 症状緩和 |
| | <input type="checkbox"/> 術前補助 | | <input type="checkbox"/> 術後補助 |
| 告知程度 | <input type="checkbox"/> 全告知 <input type="checkbox"/> 部分告知 <input type="checkbox"/> 未告知 | | |
| 告知内容 | <input type="checkbox"/> 癌(原発・再発・進行) | | |
| | <input type="checkbox"/> 抗癌剤を使用する | | |
| 服薬指導 | <input type="checkbox"/> 依頼する | | |
| | 看護師() 薬剤師() | | |
| 身長: cm 体重: Kg | | | |
| 体表面積 m ² | HBV感染スクリーニング | <input type="checkbox"/> 確認済み | |

胆道癌 GCS療法

CDDP 25mg/m²
GEM 1000mg/m²



1コース 2週間
S-1は、1週間内服後、1週間休薬
CDDPとGEMは、Day1に投与

| 投与開始日 | 年 | 月 | 日 | コース予定 |
|----------------------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| ● CDDP | 25mg/m ² | Day 1 | 計算量: _____ mg | 投与量: _____ mg |
| (CDDP:一般名シスプラチン、商品名シスプラチン) | | | | |
| ● GEM | 1000mg/m ² | Day 1 | 計算量: _____ mg | 投与量: _____ mg |
| (GEM:一般名ゲムシタビン、商品名ゲムシタビン) | | | | |
| ● S-1 | 80~120mg/日 | 7日間 | 投与量: _____ mg | |
| (1日目の夕~8日目の朝まで内服) | | | | |

【投与スケジュール】

| Day1 | 内服薬 アプレピタントcp125mg シスプラチン開始1時間~1時間30分前に服用 | | | |
|------|---|------------|-----|------------|
| | 1) | ブドウ糖 500mL | 1V | 1時間 |
| | 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) | 8mL | | |
| 2) | パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL | 1V | 15分 | |
| | デキサート注射液1.65mg/0.5mL | 4A | | |
| 3) | 生食 400mL | | 1時間 | |
| | シスプラチン () mg | | | |
| 4) | 生食 100mL | 1V | 30分 | 必ず30分間でDIV |
| | ゲムシタビン () mg | | | |
| 5) | ブドウ糖 500mL | 1V | 1時間 | |

【Day2、3の内服薬】

| | | | | |
|--------|---------------|-----|----------|-----|
| Day2、3 | アプレピタント(80mg) | 1cp | 午前中 | 2日間 |
| | デカドロン(4mg) | 2錠 | 分2 朝・昼食後 | 2日間 |