がん化学療法治療計画書 食道−② 2022.1

担当医/指導医	／
目的	□ 積極的治療 □ 症状緩和
	□ 術前補助 □ 術後補助
告知程度	□全告知 □部分告知 □未告知
告知内容	□ 癌（ 原発 ・ 再発 ・ 進行 ）
	□ 抗癌剤を使用する
服薬指導	□ 依頼する 看護師（ ） 薬剤師（ ）
HBV感染スクリーニング	□ 確認済み

身長: cm	体重: Kg
体表面積	m^2

食道癌 FP療法

投与開始日 年 月 日　　1コース 4週間

● 5−FU 800mg/m^2 Day 1〜5 4週間毎　計算量: mg 投与量: mg
（5-FU：一般名フルオロウラシル、商品名フルオロウラシル）

● CDDP 80mg/m^2 Day 1 4週間毎　計算量: mg 投与量: mg
（CDDP：一般名シスプラチン、商品名シスプラチン）

【投与スケジュール】

Day1	1） パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート 1．65mg	1V 6A	15分	メイン	
	2） EL−3号 500mL	1V	12時間	側管②	
	3） 生食 500mL 5-FU （ ）mg	1V	24時間	側管①	EL−3号と一緒に
	4） ヴィーンF 500mL 硫酸Mg補正液（1mEq/mL）	1V 8mL	1時間	側管③	
	内服薬 アプレピタントcp125mg シスプラチン投与1時間〜1時間30分前に服用				
	5） マンニットールS 300mL	1V	1時間	側管③	
	6） 生食 350mL シスプラチン （ ）mg		2時間	側管③の側管	
	7） ラクテックG 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	2時間	側管③	
	8） EL−3号 500mL	1V	12時間	側管②	
Day2，3	内服薬アプレピタントcp80mg 午前中服用				
	1） 生食 50mL デキサート 1．65mg	1V 4A	15分	メイン	
	2） EL−3号 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	6時間	側管②	
	3） 生食 500mL 5-FU （ ）mg	1V	24時間	側管①	EL−3号・ラクテックGと一緒に
	4） ラクテックG 500mL	1V	6時間	側管②	
	5） EL−3号 500mL	1V	6時間	側管②	
	6） ラクテックG 500mL	1V	6時間	側管②	
Day4，5	1） 生食 50mL デキサート 1．65mg	1V 4A	15分	メイン	
	2） EL−3号 500mL プリンペラン 10mg	1V 1A	8時間	側管②	
	3） 生食 500mL 5-FU （ ）mg	1V	24時間	側管①	EL−3号・ラクテックGと一緒に
	4） ラクテックG 500mL	1V	8時間	側管②	
	5） EL−3号 500mL	1V	8時間	側管②	
	6） 生食 50mL	1V	ルートフラッシュ用(Day5のみ)		

特記事項